

植入式人工血管注射座(Port-A)的認識與居家照護

◆什麼是植入式人工血管注射座？

人工血管注射座俗稱 Port-A，是一種矽質合成品，可與人體組織同時存在，在臨床使用的安全性以及實用性相當高，可以做為長期且多次注射用，避免病人注射藥物時重覆受靜脈穿刺之苦；人工血管注射座之植入須於開刀房進行，可安排住院或門診方式執行。

◆人工血管適用範圍

1. 需長期注射化學治療藥物的患者。
2. 長期輸血或其他需連續且長期性藥物注射。
3. 長期靜脈營養注射。

◆人工血管注射座(Port-A)的居家照護

◎傷口未拆線前：

1. 人工血管術後傷口約有 4-5 公分，皮膚會有稍微凸起，因為皮膚上的傷口未癒合，應該注意傷口的清潔(每天以無刺激性優碘消毒並以紗布覆蓋)及乾燥，以預防傷口感染。
2. 換藥時需注意傷口有無紅、腫、熱、痛或分泌物及發燒等情況，若有應立即到醫院給醫師診視。
3. 手術後 7-10 天記得依醫師預約時間返院評估傷口及拆線。

◆化學治療中及療程結束後：

1. 每次化療後 Port-A 針拔除前，護理師會用抗凝血劑沖洗人工血管注射座。
2. 須每月返院以抗凝血劑沖洗注射座(最久建議不可超過 6 週)，以避免阻塞影響日後人工血管注射座之功能。
3. 人工血管注射座沖洗後，所覆蓋之紗布於洗澡時或流汗潮濕時，即可拆下，以避免感染。

4. 返家後應隨時注意人工血管注射周圍的皮膚，若有紅、腫、熱、痛、出血、異常分泌物及發燒等情形時，須立即返院給醫師診察。
5. 人工血管注射座傷口癒合後，可從事一般日常活動，但為避免移位，裝置側手臂勿做過度運動，如：快速或劇烈 360 度旋轉、提舉過重物品、用力碰撞或經常用手擠壓；若有頸部或手臂腫脹情形，需立即返院求治。



國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院

關心您

製作單位：六病房製

製作日期：10208

修訂日期：10604

DL-06-1-001