

植入式人工血管注射座(Port-A)的認識與居家照護

◆什麼是植入式人工血管注射座？

人工血管注射座俗稱 Port-A，是一種矽質合成品，可與人體組織同時存在，在臨床使用的安全性以及實用性相當高，可以做為長期且多次注射用，避免病人注射藥物時重覆受靜脈穿刺之苦；人工血管注射座之植入須於開刀房進行，可安排住院或門診方式執行。

◆人工血管適用範圍

1. 需長期注射化學治療藥物。
2. 長期靜脈營養注射。
3. 長期輸血或其他需連續且長期性藥物注射。

◆人工血管注射座(Port-A)的居家照護

◎傷口未拆線前：

1. 人工血管手術術後傷口約有 4-5 公分，皮膚會有稍微凸起，因為皮膚上的傷口未癒合，應該注意傷口的清潔及乾燥，以預防傷口感染，請依照醫護人員衛教方式進行傷口照護。
2. 若傷口有紅、腫、熱、痛、發燒或分泌物等情況，需立即返院求治。
3. 手術後 7-10 天記得依醫師預約時間返院評估傷口及拆線

◆注意事項：

1. 化學治療期間，每次化療後 Port-A 彎針拔除前，護理師會使用抗凝血劑替您沖洗人工血管注射座。
2. 化學療程結束後每次回診時，請醫師開立門診注射室醫囑單，並於批價後攜至門診注射室或原化療住院病房執行沖洗。
3. 人工血管注射座須每月以抗凝血劑沖洗注射座(最久建議不可超過 6 週)，以避免阻塞。



4. 人工血管注射座沖洗後，所覆蓋之紗布於洗澡時或流汗潮濕時可拆下，以避免感染。
5. 返家後應隨時注意人工血管注射周圍的皮膚，若有紅、腫、熱、痛、出血、發燒或異常分泌物等情形時，須立即返院求治。
6. 人工血管注射座傷口癒合後，可從事一般日常活動(如：洗澡、打太極拳，但不要故意去壓迫 Port-A 凸起的地方)。
7. 因整個基座縫在肌肉，用力或外力易使它脫落，所以 Port-A 同側手臂應避免用力(如提重物勿超過 10 公斤)和快速 360 度旋轉。
8. 若頸部或手臂若出現腫脹情形，須立即返院求治。
9. 女性病友若有人工血管注射座凸起，讓您覺得穿內衣感到不方便、會摩擦或不適時，建議可穿著單邊肩帶的內衣或無肩帶內衣，減少不適。

製作單位：8W
製作日期：112.08
修訂日期：113.08
DL-08-1-016



國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院

關心您