

攜帶式化療注射器自我照顧〔1〕

攜帶式化療注射器是一種連續性自動輸液幫浦(俗稱奶瓶)、不需電力、方便輕巧隨時攜帶的化療方式，不影響您的日常生活。

●攜帶式化療注射器的費用

健保給付：一日型及二日型攜帶式化療注射器

須自費：「五日型」的攜帶式化療注射器，約 1500-1600 元左右，依當時公告費用為依據。



●攜帶式化療注射器返家注意事項

1. 壓克力製品，不可直接日曬、勿接近熱源，避免受熱而發生爆破。
2. 注射期間，注意「止液夾」是否為打開狀態，維持注射通順。
3. 活動時，避免拉扯注射管路，以防注射處移位。
4. 洗澡以沖澡為佳，避免泡澡，以免影響到藥物注射的速度。
5. 穿著寬鬆、前開式上衣，避免套頭式，穿脫衣服的時候要特別注意，避免拉扯注射管路。
6. 藥物注射完畢，可依建議時間回醫院拔除。



國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院

關心您

攜帶式化療注射器自我照顧〔2〕



●如何觀察輸液狀況

1. 儲藥囊會隨滴注時間而變小(圖一)，如果沒有請立刻返院處理。
2. 輸注完畢(圖一)時間若提早或延後，可能為藥物濃度、環境溫度、人工血管順暢度等原因而出現時間差，可以記錄結束時間，以供醫護人員參考。

●下列情形立即關閉管夾(圖二)，返院處理。

1. 注射部位感覺異常：脹脹、滲液(濕濕的感覺)、刺刺麻麻等。
2. 注射管路斷裂或鬆脫。
3. 注射器出現破裂。
4. 儲藥囊並沒有隨時間而縮小。
5. 發燒、發冷或顫抖。



參考資料來源：成大總院 OPC
製作單位：8W
製作日期：111.04
修訂日期：113.08
DL-08-1-018



國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院

關心您