

返家使用止痛貼片(吩坦尼穿皮貼片劑)的注意事項



一、簡單的使用方法

- (一)使用前才撕開包裝袋，取出貼片，務必要撕去背膜。
- (二)選擇適當的部位，清潔並等完全乾燥後才貼上(如脫落可用透氣膠帶加強)。
- (三)使用後，用清水洗手(勿用肥皂，可能改變皮膚的通透性)。
- (四)紀錄使用的日期和時間。
- (五)依醫生指示時間進行更換，並將貼片對折。
- (六)放入回收袋，於回診時由醫師簽章後並在領藥時交回藥局。

以下兩項由醫護人員填寫

日期	月 日 星期_____	月 日 星期_____	月 日 星期_____	月 日 星期_____
天數、時間 使用紀錄	最後一次在醫院使用的日期及時間			
日期	月 日 星期_____	月 日 星期_____	月 日 星期_____	月 日 星期_____
天數、時間 紀錄使用				
日期	月 日 星期_____	月 日 星期_____	月 日 星期_____	月 日 星期_____
天數、時間 紀錄使用				



國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院

關心您

二、病人使用須知

- (一)依醫師指示貼在合適位置，如前胸、後背、上半臂、大腿等乾爽、潔淨、完整的平坦位置（不需痛哪裡貼哪裡），若病人有腹水，腹部則不適合，禁止貼在腹水、水腫部位。
- (二)請避開傷口和放射線治療部位。
- (三)使用部位先以清水清潔待完全乾燥後才貼上。
- (四)若無法避免有體毛部位，請剪去(不可用刮或剃)。
- (五)黏貼後以手掌緊壓 30 秒，以確保貼片(及四周)完全緊貼。
- (六)整片使用，不要切割或剪開，以免破壞其緩釋劑型。
- (七)依醫生指示每 2~3 天更換一次，每次請換貼不同部位，舊膠痕應除去。
- (八)避免泡熱水澡、泡溫泉，或將貼片直接接觸熱源，如熱水袋、電毯等。
- (九)第一次使用不可馬上停用原止痛藥(請依指示慢慢停)，止痛貼片貼上後 10-12 小時才會有藥效發揮。
- (十)使用貼片的期間，若仍有疼痛情形發生，請持續依醫師指示服用止痛藥，或是返回門診與醫師討論，切勿再加貼止痛貼片。
- (十一)此藥可能有噁心、嘔吐的副作用，門診時請一定要告訴醫師，調整藥物減緩症狀。
- (十二)如有嗜睡、呼吸減少或困難、低血壓請立即返院求診。

三、特別注意事項

為維護您的使用權利，請遵循以下事項：

- (一)請務必填寫紀錄表(貼上及撕下的日期時間)，並簽名。
- (二)使用過的貼片請對折放入回收袋。
- (三)回診時由醫師簽章，並在領藥時繳回(紀錄表及貼片)。
- (四)請不要將藥品放在潮濕、過熱或陽光直曬的地方，且要避免兒童接觸。
- (五)依麻藥管理法，如藥品短缺需說明原因，否則無法再開處方。

參考資料來源：成大總院 10B

製作單位：8W

製作日期：111.04

修訂日期：113.08

DL-08-1-022



國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院

關心您