

# 心臟病怎麼吃才健康？

## 可控制的危險因子

### 1. 高血脂症：


體內血清膽固醇及三酸甘油脂含量過高，尤以總膽固醇量及低密度脂蛋白膽固醇濃度過高，高密度脂蛋白含量過低，容易得到冠狀動脈疾病。

### 2. 抽菸：

尼古丁會使血管收縮、心跳加快、血壓增加影響心肌功能，產生的一氧化碳會使血小板凝集，引起血栓阻塞冠狀動脈。

### 3. 高血壓：

控制血壓勿超過 160/90mmHg 以上。



## 飲食治療

★不當的飲食習慣是造成血中膽固醇及血脂過高常見的原因。採用低膽固醇、低脂肪飲食；多攝取蔬菜、水果，可幫助膽固醇的代謝。

### ★烹調方式：

- 選用去皮瘦肉（如：雞、魚），湯汁可去除上層油脂，來減少含油量。
- 可用蒸、燉、烤、紅燒、涼拌等方式來增加可口性，並減少炸、煎、炒。
- 少用刺激性調味品，如辣椒、咖哩粉，可用蔥、薑、蒜、白醋、五香、八角、低鹽醬油等調味，盡量選擇新鮮的食物並自行製作。

### ★避免食用之食品：

- 動物內臟、蛋黃、魚卵；煉乳、全脂奶粉、冰淇淋、鮮奶油、乳酪、沙拉醬、豬油、清香油、肥肉、五花肉、蹄膀、豬皮、雞皮、熱狗、肉圓、油豆腐、火腿、香腸、豬肉乾、肉鬆、鹹蛋、滷味、麵線、油麵；燒餅、油條、鍋貼、煎包、蔥油餅、蛋糕、小西點、蘇打餅乾、喜餅、瓜子、花生、腰果、杏仁
- 調味類：味精、鹽、豆瓣醬、沙茶醬、蠔油、番茄醬、豆鼓、味噌、醬油



國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院

關心您

- 海鮮類：牡蠣、蝦、鮑魚、墨魚、蛤、鰻、章魚、鹹魚
- 罐頭製品：肉醬、花瓜、蔭瓜、麵筋、豆腐乳、海苔醬
- 速食品：炸雞、漢堡、可樂、薯條
- 醃製蔬菜：榨菜、梅干菜、泡菜、雪裡紅、乾果類、蜜餞。
- 酒：大量烈酒傷害心臟，少量酒 20~30ml 可促進血液循環及加強藥物的作用。
- 咖啡、濃茶：興奮心臟神經，增加心臟負擔及影響心臟的傳導功能。
- 高麗蔴：含有多量的中樞神經刺激劑會使血壓升高增加心臟工作量。

## 日常生活注意事項

1. 維持理想體重---男性：(身高 - 80) × 0.7，女性：(身高 - 70) × 0.6
2. 避免抽菸及二手菸，避免喝酒及含咖啡因等刺激性飲料。
3. 按時服用正確的藥物，定期回診。若有糖尿病或高血壓，應作好病情的控制。
4. 以三餐為主，少用點心；細嚼慢嚥，七、八分飽即可，熱量應以維持標準體重為準，不宜過量。
5. 預防便秘
  - (1). 養成每天大便習慣，避免排便時用力，會增加排便暢通的方法：多吃蔬菜水果，纖維製食物。
  - (2). 多作腹部運動。
  - (3). 保持心情輕鬆，勿緊張。
  - (4). 與醫師討論後，必要時用輕瀉劑。



參考資料來源：成大總院 9B  
製作單位：6W  
製作日期：111.04  
修訂日期：112.06  
DL-06-1-010



國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院

關心您