

Aspirin(阿斯匹靈)藥物衛教

【為什麼需要使用此藥物】

減少血液凝結，降低或預防血栓形成

【該怎麼使用此藥物】

不要自行停藥或調整藥物使用量

【劑型】



(Bokey 伯基)(膠囊不可磨粉)



【副作用】

- 1.腸胃：噁心、胃腸不適、出血，使消化性潰瘍惡化。
- 2.皮膚：可能出現蕁麻疹、皮疹。
- 3.血液：出血時間延長。



【如果忘記服用藥物該怎麼辦】

請您儘快服用，但如果距離下次服藥時間已經很接近(12小時內)，那麼就跳過不必吃，依照下次吃藥時間、藥量使用。不要下次服藥時，增加用量。

【返家後注意事項】

1. 酒精可能會增加腸胃道出血風險。
2. 服抗發炎、抗凝血藥物、保健食品(如銀杏)，請主動告知醫師。
3. 如有解黑便、血尿，回門診時須告知醫師。
4. 為了避免胃腸不適，請儘可能飯後服用此藥，或配合牛奶一起服用。
5. 若您懷孕了，使用此藥物前請詢問醫師。
6. 服用此藥會有出血時間延長，所以手術、拔牙前應事先告知醫師，評估停藥的時間。

參考資料來源：成大總院 5C
製作單位：6W
製作日期：112.06
修訂日期：113.10
DL-06-1-017

