

內視鏡乳突切開術



Endoscopic Papillotomy



國立成功大學醫學院附設醫院
斗六分院關心您

哪些人需要做？



總膽管結石、阻塞性黃疸、膽道發炎或感染者。

什麼是內視鏡乳突切開術？

藉由內視鏡將膽道出口之乳突部分切開，使膽道出口變大，可將膽石取出或使膽汁順利排出。

執行前注意事項：

前一天

1. 醫師給予口頭及同意書之書面說明後，若你已了解並同意，請將同意書填妥後交給醫護人員。
2. 抽血檢驗凝血功能（包括血小板、出血時間、凝血時間），若檢驗值異常，會先予以處理，以減少術後出血合併症之發生。若有服用抗凝血劑或



當天

- 抗血小板劑，如阿斯匹靈 (Aspirin)、保栓通 (Plavix)、可邁丁 (Coumadin)、應告知醫護人員，至少需停藥 7 天才能安排檢查，以避免出血之危險。
3. 術前需禁食八小時，若時間是隔天早上，請於晚上 12 點後禁食；若在隔天下午，則當天早餐吃完後再開始禁食即可。



執行後注意事

1. 返回病房後仍需禁食 6-8 小時，之後若無嚴重併發症，待醫師囑咐後才可進食。
2. 護理人員會定時幫你測量血壓、心跳，以便觀察是否有內出血的先兆。



3. 如有發燒、噁心、嘔吐、腹痛等症狀請告知醫護人員。
4. 隨時觀察大便的顏色、性質，如解便異常（如血便、黑便）請立即告知醫護人員。

參考資料來源：成大總院 6B

製作單位：6W

製作日期：111.04

修訂日期：113.08

DL-06-2-003