

# 下腸胃道鋇劑灌腸攝影須知



## 一、什麼是下腸胃道攝影？

下腸胃道攝影是藉由 X 光影像觀察大腸全部(包括盲腸與闌尾外型及各部份運動情形，以便檢查功能上是否有病變，同時檢查大腸形狀有無異常、有無阻塞、潰瘍、腫瘤、憩室或息肉等現象已幫助診斷)，為求獲得最佳影像，大腸內容物須於檢查前儘可能排空，以求達到最好的效果。



## 二、檢查禁忌

1. 呼吸困難
2. 休克
3. 意識混亂
4. 心臟衰竭
5. 下腸道阻塞

## 三、檢查前的準備

1. 醫師會向您說明檢查目的。
2. 填寫 X 光檢查志願書。
3. 檢查前一天需進食吃清淡流質或低油、低渣的飲食，勿吃肉、魚、牛奶、蛋類及蔬果類食物。




4. 顯影劑過敏者，須先告知醫師。
5. 檢查前一天晚上依醫囑會給予瀉劑(4 顆橘黃色小藥丸及蓖麻油 30 cc)，幫助清潔腸道，以利檢查。
6. 服藥後需多喝水以加強清腸效果。
7. 送檢查前請先排空膀胱。
8. 若前晚無解出大便或仍解出成形便，請告知護理人員處理。
9. 檢查前須禁食 8 小時(包含水)。
10. 需多帶一套病服至檢查室以備用。



國立成功大學醫學院附設醫院  
斗六分院關心您

#### 四、檢查過程

1. 換上檢查衣，躺上 X 光轉動台，同時放輕鬆。
2. 姿勢：採側臥式。
3. 將一條長約 65 公分的帶燈軟管插入肛門。
4. 在 X 光透視下，由軟管慢慢灌入適量的硫酸鋇劑與空氣到大腸中，讓您的大腸充滿空氣、腸黏膜充滿鋇劑為止。
5. 灌注硫酸鋇時配合深呼吸放輕鬆，勿將鋇劑解出。
6. 灌注或照像過程中有任何不適請立即告知醫護人員。



~3~

#### 五、檢查後護理

1. 檢查完畢後如無不適(如腹痛、腹脹等生理現象)，則可開始進食，若有任何不適請告知醫師或護理師。
2. 請多喝水(約 1000 至 1500 c.c)、多吃蔬菜、水果，以利鋇劑排出，因鋇劑關係，大便会成白色是正常現象，會逐漸恢復原來的大便顏色。
3. 翻身活動或熱水坐浴，可促進鋇劑排出，避免鋇劑凝固造成便秘發生。
4. 若未排出鋇劑請告知醫護人員為您處理。

參考資料來源：成大總院 8B

製作單位：6W

製作日期：111.04

修訂日期：113.08

DL-06-2-005



~4~