


## 傷口引流管的護理

爲了將腔室內的血液及體液或體內的膿瘍性分泌物引流出來，醫師必須為您放置傷口引流管，請注意以下的照護原則，避免引流液刺激管路周圍皮膚，預防感染，幫助早日康復。

### 一、傷口自我檢查與照護：

(1) 保持傷口乾燥，如有發紅、腫脹、劇痛，若傷口有異味或引流液變鮮紅血色，應盡速就醫。

(2) 傷口每天換藥 1 次  
※若紗布滲濕或脫落時



(1) 引流袋維持在傷口部位以下避免逆流  
(2) 引流袋可用別針固定在適合的地方，勿拖垂或放在地上。

液體到達袋子的一半時需倒出並紀錄。  
(背面有表格方便您紀錄)

引流袋 7 天換一次(於袋上註明起訖日)


※若管路滑脫時，處理方式如下：

- (1) 立即以紗布蓋住管路傷口處，以手加壓避免引流液滲出，並立即告知醫護人員。若於家中發生管路滑脫情形，須依照上述內容做緊急處理後立即前往醫院。
- (2) 保留滑脫的引流管，測量滑出的引流管長度，並和原始長度比較是否有短少，以確認是否有斷裂剩餘的管路留在病人的體腔中。
- (3) 如果引流管有斷裂，則將斷裂的引流管放入夾鏈袋中保存，並交由醫護人員。



## 二、換藥方式：

【步驟1】取優碘及生理食鹽水棉棒各1支，由內而外環形消毒傷口及引流管。




【步驟2】以Y型紗布將引流管固定，再用方形紗布覆蓋傷口及引流管。

【步驟3】使用方形紗布覆蓋傷口及引流管。



【步驟4】用紙膠井字形固定紗布。



【步驟5】使用紙膠採兩段式將引流管袋固定妥，每天更換固定部位，避免因膠帶過黏造成皮膚受損。

