國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院新聞稿

主題:以【指甲矯正】治療捲甲及嵌甲-手術以外的新方法

發表日期: 109年10月12日(星期一)

發表人:皮膚科/杜威廷醫師

從 40 多歲開始,張先生雙腳大拇趾慢慢出現「捲甲」的情況已十多年了。相較於一般人平坦僅略微彎曲的指甲,他的大拇趾指甲明顯捲曲成喇叭狀,只要行走過久,兩腳大拇指便會疼痛腫脹;平時若不慎踢到東西,更會痛到眼淚都快流了出來。

為此,張先生時不時就需要把捲曲的指甲剪掉。可是,指甲捲入甲肉的部分修剪不易,常常剪到流血,引起嵌甲(俗稱「凍甲」)而發炎化膿。在多次拔除指甲後仍復發的情況下,張先生決定就醫接受指甲矯正。經過1次治療,大拇趾的疼痛就有明顯改善,而在半年後,指甲已變得和一般人一樣平坦。

成大醫院斗六分院皮膚科杜威廷醫師表示,指甲能保護指尖及指骨、增加觸覺的敏銳度、幫助撿起微小的物體、提供搔抓的功能,完好的指甲也能讓手/腳指看起來更美觀。但常見的指甲疾病「捲甲」及「嵌甲」,卻讓指甲和指頭變形,手/腳趾疼痛、腫脹、發炎,甚至感染,嚴重影響病人的日常生活。

傳統上,捲甲和嵌甲都可以使用手術切除指甲基質、甲肉、指甲片來治療,或者是將下捲/嵌入的指甲拔除,但會造成手術傷口及治療時和恢復期的疼痛;術後需要換藥 1~2 週,也有相當的復發率。在拔除下捲/嵌入的指甲後,加上化學或電氣燒灼術雖可以減低復發率,卻會造成指甲外觀永久的改變。


杜威廷醫師說,指甲矯正已取代部分捲甲和嵌甲病人的手術治療。大部分的指甲矯正器由特殊的金屬線構成,有些會有用來黏貼指甲的基座。藉由將具有彈性的金屬線附著在指甲上,金屬線會對下捲或嵌入的指甲施加拉力,將其恢復到正常的形狀。這樣的做法能減輕疼痛及發炎,改善指甲的外觀,相較於單純拔除指甲,復發率也大幅降低。

一般而言,放置指甲矯正器並不需要麻醉,治療時間依照每個人的指甲狀況而定,過程僅有些微不適感或疼痛。在置放完成後,大多數病人都可以立即恢復正常生活。除了踢球等會對指甲矯正器直接造成衝擊的運動外,幾乎所有運動都可以照常進行。

依據醫學文獻,以指甲矯正器治療的病人,一年後復發率約為 10%。 在經過指甲矯正後仍反覆發生甲肉疼痛的病人多半是有治癒的指甲 黴菌感染、持續不當修剪指甲、或步態與骨骼的異常。

杜威廷醫師也提醒指出,並不是所有指甲或指甲周邊的疼痛都來自捲 甲或嵌甲。許多指甲黴菌感染的病人,即使沒有捲甲或嵌甲也會有指 頭的疼痛。部分病人則是有壓迫到指甲基質的皮膚良性腫瘤。此外, 少數的指甲慢性變形,經過數次拔指甲效果仍不佳的病人則是有甲床 或指甲基質的癌症。這些疾病所需要治療各有不同,因此,若遇到指 甲相關的疾病時,應主動前往醫院就診。

(本篇內容旨在提供一般醫療衛教知識,如有不適或疾病,應尋求專 科醫師的診治,以免貽誤病情,並能獲最佳治療的效果。)



杜威廷醫師資歷:

一人		
專科別	現職	經歷
	● 成大醫院皮膚部	● 台灣大學醫學院附設醫院一般科
	主治醫師	醫師訓練
皮膚科	● 成大醫院斗六分	● 部立雙和醫院皮膚科住院醫師
	院皮膚科主治醫	● 部立雙和醫院皮膚科總醫師
	師	● 成大醫院皮膚部主治醫師

專長

● 指甲問題、皮膚外科、遺傳性皮膚病、黴菌感染症

新聞聯絡人:管理中心行政組/高得雅

電話:(05)533-2121 分機 6203